일반의약품

20mL

보령 우황청심원 현탁액

천연사향 함유



보령제약

[원료 약품 및 그 분량] 100mL 중

유효성분 : 산약(KP) 1410mg, 감초(KP) 1010mg, 인삼(KP) 485mg, 포황(생규) 500mg, 신곡(생규) 500mg, 대두황권(생규) 350mg, 육계(KP) 350mg, 아교(생규) 350mg, 작약(KP) 300mg, 맥문동(KP) 300mg, 황금(KP) 300mg, 당귀(KP) 300mg, 방풍(KP) 300mg, 백출(KP) 300mg, 시호(KP) 250mg, 길경(KP) 250mg, 행인(KP) 250mg, 복령(KP) 250mg, 천궁(KP) 250mg, 우황(KP) 70mg, 사향(생규) 25mg, 영양각(생규) 175mg, 용뇌(생규) 205mg, 백렴(생규) 150mg, 건강(KP) 150mg **-동물유래성분** : 아교(소, 가죽), 우황(소, 담낭), 사향(사슴, 행낭), 영양각(영양, 뿔) **-첨가제**(보존제) : 파라옥시벤조산프로필 3.5mg, 파라옥시벤조산메틸 5.5mg **-기타 첨가제** : 꿀, D-소르비톨액, 백당, 농글리세린,조합 향료(시트러스향 91069), L-멘톨, 카르복시메틸셀룰로오스나트륨, 폐틴, 잔탄검, 시트르산나트륨수화물, 베타덱스, 실리콘수지, 에탄올, 정제수

[성상] 갈색의 유리병에 든 갈색의 방향성 불투명 현탁화제

[효능 · 효과] 뇌졸중(전신불수, 수족불수, 언어장애, 혼수, 정신혼미, 안면신경마비), 고혈압, 두근거림, 정신불안, 급 · 만성 경풍, 자율신경실조증, 인사불성

[용법 · 용량] 보통 성인 1회 1병(1회 용량 20mL), 1회 8~15세 2/3병(성인 용량의 2/3), 5~7세 1/2병(성인 용량의 1/2), 2~4세 1/3병(성인 용량의 1/3), 1세 이하 1/4병(성인 용량의 1/4)을 1일 1~2회 복용합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고 : 혈압 강하의 목적으로 복용할 경우에는 전문인의 지시에 따라 복용하십시오.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의하십시오. 1) 고혈압 환자 2) 심장애 또는 신장애 [신장(콩팥)장애] 환자 3) 부종[부기] 환자 4) 고령자[노인](일반적으로 고령자[노인]는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의 하십시오.) 5) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자) 6) 현저하게 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부불쾌감, 구역 구토, 설사 등이 나타날 수 있습니다.) 7) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있습니다.) **3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의하십시오. 상담시 가능한한 이 문안을 소지하십시오.** 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 (1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나, 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나, 두통 등(1일 최대 배합량이 감초로서 1 g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류[쌓임], 부종[부기], 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지하십시오.) (2) 근병증[근육병증] : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증[근육병증]이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지하십시오. (3) 피부 : 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 두드러기, 가려움 등 (4) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 설사 등 2) 수일간 복용하여도 증상의 개선이 없는 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항 1) 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의하십시오. 2) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오. 3) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제 (트리클로르메티아지드)와 병용[함께사용]시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증 으로 인하여 근병증[근육병증]이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용하십시오. 4) 안면[얼굴]마비, 정신불안, 수족마비, 언어장애의 경우 유효율이 66.7% 이상 나타났다는 임상보고가 있습니다. 5) 원방우황청심원과 변방우황청심원의 비교 임상시험결과에 의하면, 뇌자기공명영상 (Brain MRI) 또는 뇌전산화단층촬영 (Brain CT)을 실시하여 뇌졸중으로 확진[확정진단]되어 안정기에 있는 환자의 운동장애와 안면[얼굴]마비에 대하여는 원방이 변방보다 유의한 효과가 인정되었으나, 언어장애와 의식장애에서는 두 제제간 유의한 차이가 확인되지 않는 등 뇌졸중 증상에 따른 효과의 일관된 차이는 보이지 않았으며, 고혈압, 두통, 머리무거움, 어지러움 등 고혈압 증상의 경우에는 두 제제간 우위를 확인할 수 없다는 임상보고가 있습니다. 6) 호흡곤란에 대한 효능이 입증되지 않아 효능 · 효과 중 호흡곤란을 삭제하였습니다. 7) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의하십시오. **5. 저장상의 주의사항** 1) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.(사용 후 반드시 밀폐 보관하십시오.). 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※ 본 제품은 생약제제의 특성상 간혹 침전물이 발생하는 경우가 있으나 약효에는 아무지장이 없으니 흔들어서 복용하시기 바랍니다. ※ 만약 구입 당시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. ※ 본 문안 작성일자 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지 www.boryung.co.kr 또는 소비자상담실에서 확인할 수 있습니다. ※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)을 참조하시기 바랍니다. ※ 본 약제 투약 또는 복용 후 부작용(이상사례)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)으로 문의 및 보고하여 주시고, 동일 기관(14-3330/1644-6223)에 의약품 부작용 피해구제 신청을 하실 수 있습니다. ※ 사용(유효)기한이 경과한 제품은 사용하지 마시기 바랍니다.

소비자상담실 수신자부담전화 : 080-708-8088 문안 작성일자 : 2021년 7월 30일

제조의뢰 및 판매자 : 보령제약(주)
경기도 안산시 단원구 능안로 107, 109
제조자 : 삼성제약(주)
경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 35