

※이 약을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의 깊게 읽어야하며, 첨부문서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.  
첨부문서 작성일자 : 2022년 4월 20일

전문의약품 품목기준코드:198800813

# 보령 퀘스트란<sup>®</sup> 현탁용산

[콜레스티라민레진]

## 원료 약품 및 그 분량 1포(9g) 중

유효성분 : 콜레스티라민레진(USP) ..... 4g  
첨가제(타르색소) : 황색203호, 황색5호  
기타 첨가제 : 아카시아, 폴리소르베이트80, 프로필렌글리콜알기네이트, 시트르산, 오렌지주스향, 백당

## 성상

오렌지향의 미황색 분말제임

## 효능·효과

1. 원발성고지혈증 : 고콜레스테롤혈증(IIa형), 고콜레스테롤혈증과 고트리글리세라이드혈증의 복합형(IIb형)
2. 부분적 담도폐쇄에 의한 가려움증
3. 고콜레스테롤혈증에 의한 관동맥질환의 발병 위험성 감소

## 용법·용량

성인 : 콜레스티라민레진으로서 1회 4g 1일 1~6회 160~180ml의 물 또는 비탄산음료 등에 균등하게 잘 섞어 식사시 경구투여하되 반드시 식이요법을 병행하십시오. 연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

## 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
  - 1) 담즙이 장관내로 분비되지 않는 완전 담도폐쇄 환자
  - 2) 이 약에 과민증 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
  - 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
  - 2) 소아
  - 3) 변비 환자
  - 4) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.
3. 부작용
  - 1) 소화기계 : 주요한 부작용으로 변비가 나타날 수 있고 또한 변비증상을 악화시킬 수 있으므로 증상이 심한 경우에는 투여량을 일시적으로 감량 또는 휴약하십시오. 복부불쾌감, 복부팽만감, 구역, 복통, 구토, 설사, 가슴쓰림, 식욕부진, 소화불량, 지방성설사가 나타날 수 있습니다.
  - 2) 담도계 : 담도폐쇄가 있는 영아에 투여시 이 약 투여와 관련이 있는 감돈이 발생하여 급성 췌장염증으로 사망한 예가 보고되어 있으며 또한 담산통이 나타날 수 있습니다.
  - 3) 비타민 A, D, K결핍증 : 야맹증, 고염소혈증성 선종(특히 소아), 골다공증, 피부·허·항문 주위의 발진·자극감, 저프로트롬빈혈증으로 인한 출혈 등이 나타날 수 있습니다.
  - 4) 다음과 같은 부작용이 나타날 수 있으나 인과관계는 불명확합니다.
    - ① 소화기계 : 직장출혈, 직장통증, 흑변, 치질혈, 십이지장궤양성 출혈, 연하곤란, 딸꾹질, 궤양, 췌장염, 게실염
    - ② 혈액 : 프로트롬빈시간 연장, 반상출혈, 빈혈
    - ③ 과민증 : 두드러기, 천식, 천식음, 빈호흡
    - ④ 골격근 : 요통, 근육·관절통, 관절염
    - ⑤ 정신신경계 : 두통, 불안, 어지러움, 피로, 이명, 실신, 졸음, 대뇌신경통, 감각이상
    - ⑥ 눈 : 선천성 각막염, 포도막염
    - ⑦ 신장 : 혈뇨, 배뇨장애, 이뇨
    - ⑧ 기타 : 체중감소·증가, 성욕증가, 선종, 부종, 치질, 치하출혈, 충치
4. 일반적 주의
  - 1) 투여전에 갑상선기능저하증, 당뇨병, 신중후군, 저단백혈증, 폐쇄성 간질환 등과 같이 혈중 콜레스테롤치를 증가시키는 질환에 대하여 검사하고 미리 적절한 치료를 하십시오.
  - 2) 콜레스테롤 감소현상은 투여 1개월 이내에 나타나며 지속적인 콜레스테롤 감소를 위하여 투여를 계속 하십시오. 만약 투여 후 1개월이 지나도 콜레스테롤 함량이 감소되지 않으면 이 약의 투여를 중지하십시오.
  - 3) 장기투여시 비타민 K결핍과 관련된 저프로트롬빈혈증으로 인해 출혈경향이 증가할 수 있으므로 이러한 경우에는 비타민 K를 공급하십시오. 또한 장기투여시 혈중 염산염이 감소될 수 있으므로 이러한 경우에는 염산을 공급하십시오.
  - 4) 이 약은 음이온교환수지의 염화물이므로 장기투여 시 고염소혈증성 선종이 나타날 수 있습니다. 이러한 현상은 특히 상대적으로 고용량을 투여받게 되는 소아나 체구가 적은 환자에게서 나타나기 쉽습니다.
  - 5) 이 약 투여 시 대변의 경화와 함께 치질 증상이 더 심해질 수 있으므로 심한 변비나 관동맥질환에 대한 임상적 증후를 나타내는 환자는 이러한 질환이 오피되지 않도록 주의하십시오.
  - 6) 혈중 콜레스테롤치를 처음 치료시 몇 달 동안은 자주 검사하며 그 후에도 정기적으로 검사하십시오. 또한 혈중 트리글리세라이드치를 정기적으로 검사하여 현저한 변화가 일어나는지 관찰하십시오.

## 5. 상호작용

- 1) 페닐부타존, 와르파린, 클로로치아지트(산성), 테트라사이클린, 페니실린-지, 페노바르비탈, 갑상선 및 티록신제제, 디기탈리스제제, 프로프라놀롤(염기성)과 병용투여 시 이들 약물의 체내흡수를 지연시키거나 감소시킬 수 있습니다.
- 2) 이 약은 담즙산과 결합하므로 정상적인 지방의 소화와 흡수를 방해하여 비타민 A, D, K와 같은 지용성 비타민의 흡수를 저해할 수 있습니다. 따라서 이 약을 장기투여할 경우에는 물에 혼합되는 비타민 A, D 제제(또는 비경구 형태)를 동시에 공급하십시오.
- 3) 이 약은 병용투여하는 다른 약물과 결합할 수 있으므로 다른 약물과의 투여간격을 가능한 길게 하며, 최소한 이 약 투여 1시간 전 또는 4~6시간 후에 다른 약물을 투여하는 것이 바람직합니다.

## 6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 이 약은 장내에서 흡수되지 않아 태아에 직접적인 악영향을 주지는 않을 것으로 기대되나 지용성 비타민의 흡수저해로 인해 치명적인 영향을 줄 수 있고 임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.
- 2) 수유부에 투여 시 지용성 비타민 결핍으로 인해 영아의 영양발육에 영향을 미칠 수 있으므로 신중히 투여하십시오.

## 7. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 신중히 투여하십시오.

**저장방법** 기밀용기, 실온보관(1~30℃), (50℃ 이상에서 보관하지 마십시오.)

**포장단위** 9g/포 x 60

- ※ 만약 구입 당시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.  
본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- ※ 본 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지 [www.boryung.co.kr](http://www.boryung.co.kr) 또는 소비자상담실에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합정보시스템([nedrug.mfds.go.kr](http://nedrug.mfds.go.kr))을 참조하시기 바랍니다.
- ※ 본 약제 투약 또는 복용 후 부작용(이상사례)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)으로 문의 및 보고하여 주시고, 동일 기관에 의약품 부작용 피해구제 신청을 하실 수 있습니다.
- ※ 사용(유효)기한이 경과한 제품은 사용하지 마시기 바랍니다.

소비자상담실 수신자부담전화 : 080-708-8088

첨부문서 작성일자 : 2022년 4월 20일

# BORYUNG

제조의뢰 및 판매자 : (주)보령 경기도 안산시 단원구 능안로 107, 109

제조사 : (주)넥스팜코리아 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-41